

МРНТИ 76.29.35.43

**ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДАННЫЕ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
ПО ДАННЫМ АНКЕТНОГО ОПРОСА.**

Д.С. Будащ, С.А. Бабанов

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Самара

Нами проведен статистический анализ установленных диагнозов профессиональных заболеваний легких в отделении профпатологии областного центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» за 2011-2015 годы, а также анкетный опрос больных с впервые установленным диагнозом профессиональных заболеваний легких по специально-разработанной анкете. В анкету были включены вопросы, позволяющие оценить качество и своевременность диагностики профессиональных заболеваний легких в условиях амбулаторно-поликлинического звена, при проведении периодических медицинских осмотров.

Установлено, что профессиональные (прежде всего пылевые) заболевания легких занимают одно из лидирующих мест в структуре профессиональной заболеваемости в Самарской области – от 15,31% до 19,57% при ежегодном анализе в период с 2011 по 2015 годы.

Анализ же медицинской документации и анкетный опрос лиц с первично установленным диагнозом профессиональных заболеваний легких показал, что среди этих больных число лиц направленных в отделение профпатологии областного центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» для обследования и решения экспертных вопросов о связи заболевания с профессией после проведения периодического медицинского осмотра (подозрение на профессиональное заболевание выявлено в ходе проведения периодического медицинского осмотра) недостаточно высок: 58,11% в 2011 году, 71,01% в 2012 году, 55,74% в 2013 году, 56,82% в 2014 году, 58,49% в 2015 году. Остальные случаи профессиональных заболеваний легких не были первично выявлены в ходе проведения периодических медицинских осмотров и были диагностированы при самостоятельном целенаправленном обращении пациентов в лечебные учреждения города Самары и Самарской области, что свидетельствует о недостаточно высоком качестве проводимых периодических медицинских осмотров работающих.

Проведенный анкетный опрос пациентов с установленным в отделении профпатологии областного центра профпатологии диагнозом профессионального

заболевания легких подтвердил недостаточно высокое качество проводимых периодических медицинских осмотров.

Согласно данным анкетного опроса среди пациентов с установленным профессиональным заболеванием легких первично самостоятельно обратившихся в лечебные учреждения был достаточно высок процент лиц у которых в ходе проведенного последнего медицинского осмотра не проводилось исследование функции внешнего дыхания: процент таких лиц, согласно данным анкетного опроса, составил от 35,0% в 2012 году до 55,26% в 2014 году.

Также среди данной категории больных выявлена значительная доля лиц, которым в ходе последнего медицинского осмотра не проводилась крупнокадровая флюорография: от 18,42% в 2014 год до 29,03% в 2011 году. Также, согласно данным анкетного опроса, существенным недостатком медицинских осмотров явилось отсутствие осмотра врача-терапевта (и/или врача-профпатолога. Также значителен процент пациентов при анкетном опросе указал на то, что при проведении последнего периодического медицинского осмотра им не проводилась аускультация.

Все это говорит о существенных недостатках, существующих при проведении периодических медицинских осмотров у работающих в контакте с промышленными фиброгенными аэрозолями, что снижает качество ранней диагностики пылевых заболеваний легких в условиях амбулаторно-поликлинического звена, не позволяет прогнозировать их течение и своевременно назначать лечебно-профилактические мероприятия.

МРНТИ 76.29.53.01

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Дудинцева, С.А. Бабанов, В.С. Лотков, Т.А. Азовскова

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Самара

Туберкулез – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая различными видами микобактерий туберкулеза. Наиболее часто встречается туберкулез органов дыхания; среди внелегочных поражений преобладает туберкулез органов мочеполовой системы, глаз, периферических лимфоузлов, костей и суставов [1].

Согласно данным государственной статистики, заболеваемость туберкулезом в России составляет 82 случая на 100 тысяч населения. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в России каждый день на туберкулез обследуются 240 тысяч россиян, из них у 320 человек